



HƯỚNG DẪN CHỦ ĐỀ

THUỐC TÊ

(KEM DÁN SỐ)

Đây là một bản tóm tắt về các loại thuốc gây tê tại chỗ được sử dụng phổ biến và được khuyên dùng cho các thủ thuật y tế và chọc kim. Luôn luôn kiểm tra với bác sĩ của bạn để xem những gì là tốt nhất cho con bạn.

SẢN PHẨM	KHẢ DỤNG*	DÙNG SAO?	TRƯỚC BAO LÂU?	NHỮNG ĐIỀU KHÁC CẦN BIẾT
KEM LMX	không cần đơn thuốc, có thể mua trực tuyến hoặc tại cửa hàng	Không làm sạch da trước (dầu tự nhiên giúp hấp thụ). Thoa một lượng nhỏ và xoa đều. Trên hết, hãy đắp một quả cầu lớn và KHÔNG chà xát vào. Đậy bằng tegaderm.	30 phút	Bạn nên áp dụng cho một số điểm để có lựa chọn về nơi có thể tiêm. Nó KHÔNG co mạch (làm cho các tĩnh mạch nhỏ hơn). Điều tốt để có sẵn sàng!
KEM EMLA	cần một toa thuốc	Không làm sạch da trước (dầu tự nhiên giúp hấp thụ). Thoa một lượng nhỏ và xoa đều. Trên hết, hãy đắp một quả cầu lớn và KHÔNG chà xát vào. Đậy bằng tegaderm.	60 phút	Bạn nên áp dụng cho một số điểm để có lựa chọn về nơi có thể tiêm. Gọi cho bác sĩ trước thời hạn để được kê đơn.
BĂNG BÓ SYNERA	cần một toa thuốc	Sử dụng như một Band-Aid	20-30 phút	Có thể đắt, nhưng thường có phiếu giảm giá trực tuyến. Nó làm giãn mạch (làm cho tĩnh mạch lớn hơn) nên có thể tốt cho các xét nghiệm máu. Gọi cho bác sĩ trước thời hạn để được kê đơn.
HỆ THỐNG J-TIP	cần bác sĩ	Làm tê da bằng cách sử dụng khí CO2 nén để đẩy lidocaine vào một vài lớp đầu tiên của da mà không cần sử dụng kim. Nó phát ra âm thanh khi được bác sĩ thực hiện.	1-2 phút	Điều này có thể khó tìm tùy thuộc vào bác sĩ của bạn. Gọi trước để xem họ có sử dụng nó không. Nó hoạt động rất nhanh vì vậy nó là một lựa chọn rất tốt khi không có thời gian.

*Tính khả dụng của một số sản phẩm này sẽ tùy thuộc vào nơi bạn ở. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập megfoundationforpain.org

